

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.09.2026 14:46:49
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Педиатрия

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ

по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)

Разработчики: кафедра факультетской и поликлинической педиатрии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Белых Наталья Анатольевна	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Дмитриев Андрей Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой детских болезней с курсом госпитальной педиатрии
Лебедева Инна Николаевна	к.м.н.	Главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее - КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Педиатрия».

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-4	80	60
ОПК-5	60	28
ПК-1	80	60
ПК-2	60	28
ПК-4	64	26

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

3. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Педиатрия».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Формулировка задания
		Задания закрытого типа
ОПК-4, ПК-1	1.	Острой респираторной вирусной инфекцией, для которой характерен конъюнктивит, является А. аденовирусная инфекция Б. риновирусная инфекция В. респираторно-синцитиальная инфекция Г. парагрипп
	2	Основным клиническим симптомом энтеробиоза является А. фебрильная лихорадка Б. зуд в заднем проходе, промежности, половых органах В. снижение остроты зрения Г. боль в суставах
	3.	Диарея в первые недели жизни характерна при А целиакии Б муковисцидозе В недостаточности лактазы Г дефиците энтерокиназы
	4.	Равномерный значительный дефицит массы тела называется А. Гипостатурой Б. Дистрофией В. Паратрофией Г. Гипотрофией
	5.	Клинически при синдроме Картагенера бывают частые А фарингиты Б синуситы В ларингиты Г конъюнктивиты
	6.	К типичным для долевой пневмонии физикальным данным относят А бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука Б ослабление голосового дрожания В коробочный звук при перкуссии Г везикулярное дыхание
	7.	К продуктам с высокой сенсибилизирующей активностью относят А коровье молоко, рыбу, яйца, арахис Б мясо индейки, картофель В рис, мясо кролика, гречку

		Г тыкву, арбуз, огурец, малину
	8.	Синдром незелюф клинически характеризуется А гиперплазией лимфоидной ткани Б повышением экспрессии CD3 и CD4 на Т-клетках В гипоплазию надпочечников Г частичной или полной агенезией тимуса
	9.	Критерием системной воспалительной реакции при течении неонатального сепсиса у новорожденных является лейкопения ____ $\times 10^9$ /л А <4 Б <3 В <5 Г < 2
	10.	К наиболее частым осложнениям нарушений сердечного ритма относят А внезапную аритмогенную сердечную смерть Б развитие легочного кровотечения В инфекционный эндокардит Г формирование приобретенного порока сердца
	11.	Если у ребенка 10 месяцев наблюдают температуру 39,5 °С, интоксикацию, прорезывание зубов и наличие в анализах мочи лейкоцитурии с бактериурией, а также лейкоцитоз и высокую СОЭ в крови, то можно предположить А реакцию на прорезывание зубов Б острый гломерулонефрит В острый пиелонефрит Г острый цистит
	12.	Критерием диагностики острого бронхита является наличие А крепитации Б диффузных двухсторонних влажных и/или сухих хрипов в лёгких В локального укорочения перкуторного звука Г усиленного дыхания в лёгких
	13.	Показатели ионов натрия и хлора в потовой жидкости у детей старше года в норме составляют (в ммоль/л) А 40-60 Б 200-300 В 100-200 Г 300-400
	14.	ЭКГ ребенка грудного возраста отличается от экг подростка А отсутствием зубца q в грудных отведениях Б отклонением электрической оси сердца вправо В отсутствием зубцов р Г отрицательными зубцами т в левых грудных отведениях

	15.	Резко болезненный воспалительный инфильтрат с гнойными стержнями в центре на задней поверхности шеи является А фурункулом Б абсцессом В карбункулом Г флегмоной
	16.	Открытие рта при надавливании на ладони новорожденного называется рефлексом А поисковым Б Бабкина В сосательным Г хватательным
	17.	Особенностью коклюша у детей первых месяцев жизни является А катаральный синдром Б апноэ В геморрагический синдром Г влажный кашель
	18.	Первичный гипокортицизм сопровождается изменениями в сыворотке крови в виде А повышения кортизола Б снижения половых гормонов В снижения кортизола Г снижения адренокортикотропного гормона
	19.	У девочек старше 13 лет основным симптомом гипогонадизма является отсутствие А увеличения молочных желез Б регулярного менструального цикла В оволосение в подмышечной области Г пубертатного скачка роста
	20.	Одной из причин первичного гипотиреоза является А травма головного мозга Б дефицит йода В гипоплазия щитовидной железы Г псевдогипопаратиреоз
	21.	Основным клиническим признаком холестаза является А кожный зуд Б наличие сосудистых звездочек В наличие «печеночных» ладоней Г астенизация
	22.	Причиной пароксизмальной одышки является А бронхиальная астма Б правожелудочковая сердечная недостаточность

		В левожелудочковая сердечная недостаточность Г обструктивный бронхит
23.	Для диабетического кетоацидоза характерны гипергликемия более ____ ммоль/л, рН менее ____ и А 5,5; 7,0; лейкоцитурия Б 20,0; 7,7; холестеринемия В 11,0; 7,3; кетонурия Г 6,6; 7,9; протеинурия	
24.	Допустимое количество лейкоцитов в анализе мочи у девочек составляет А не более 5-8 в поле зрения Б 25-50 в поле зрения В до четверти поля зрения Г 12-20 в поле зрения	
25.	Одним из проявлений миокардита является А грубый, скребущего характера систолический шум вдоль левого края грудины Б расщепление ii тона над аортой В снижение вольтажа желудочкового комплекса на экг Г машинный диастолический шум на основании сердца	
26.	Анализ мочи по Нечипоренко следует проводить при А оксалурии Б бактериурии В протеинурии Г лейкоцитурии	
27.	Наиболее частой причиной запоров в детском возрасте является А болезнь Гиршпрунга Б функциональное нарушение В миелодисплазия Г муковисцидоз	
28.	Методом определения сатурации кислорода является А пульсоксиметрия Б бодиплетизмография В пикфлоуметрия Г вентилометрия	
29.	Битональный кашель характерен для А острого простого бронхита Б ларинготрахеита В острый обструктивный бронхит Г аспирации инородного тела	
30.	Ведущим клиническим синдромом периода разгара рахита при остром течении заболевания является а краниотабес	

		б мышечная гипертония в судорожный синдром г анемия
	31.	Сочетание протеинурии, гематурии (измененные эритроциты), отеков и артериальной гипертензии характерно для А гломерулонефрита Б цистита В пиелонефрита Г интерстициального нефрита
	32	Пиурия может наблюдаться при А гломерулонефрите Б пиелонефрите В интерстициальном нефрите Г тубулопатии
	33	У детей с недостаточностью соматотропного гормона (СТГ) наблюдают А макрогнатию Б низкое расположение ушей В кукольное лицо Г горбинку на переносице
	34.	Наступление периода полового созревания у мальчиков начинается с А увеличения полового члена в длину Б пигментации мошонки В мутации голоса Г увеличения яичек
	35.	Нарушениями сердечного ритма, которые требуют неотложных мероприятий, являются А пароксизмальная тахикардия, синдром Морганьи – Адамса – Стокса Б АВ-блокада 2 степени, желудочковая экстрасистолия В синдром ранней реполяризации, блокада ножек пучка Гиса Г суправентрикулярная экстрасистолия, WPW-синдром
	36.	При гастродуодените наиболее характерна локализация болей в А правом подреберье Б пилорoduоденальной зоне В ниже пупка Г левом подреберье
	37.	Методом определения кислотности желудочного секрета является А фракционный метод Б уреазный тест В дыхательный тест Г рН-метрия

	38.	При облитерирующем бронхиолите поражаются А респираторные бронхиолы Б бронхи среднего калибра В альвеолярные ходы Г капилляры
	39.	Определяемый с рождения систолодиастолический шум во ii-iii межреберье слева наиболее характерен для А открытого артериального протока Б коарктации аорты В дефекта межжелудочковой перегородки Г митрального порока сердца
	40	Аускультативным признаком пролапса митрального клапана является А поздний систолический шум на верхушке Б митральный щелчок в 3-4 межреберье В акцент ii тона на лёгочной артерии Г диастолический шум
	41	Рентгенологическая картина сердца в виде «деревянного башмачка» характерна для А тетрады фалло Б открытого атриовентрикулярного канала В тотального аномального дренажа легочных вен Г транспозиции магистральных артерий
	42	Диагностическим критерием лейкоза при исследовании костного мозга является обнаружение _____ % бластных клеток А 5 Б 30 В 90 Г 50
	43.	Врожденный рефлекс Бабинского угасает в возрасте А 5,5-6 месяцев Б 1,5-2 года В 2,5-3 года Г 3,5-4 месяца
	44.	Особенностями ЭКГ у детей первого года жизни считают А синусовую брадикардию, отклонение электрической оси влево, отрицательные зубцы т в iii стандартном и v1-v3 отведениях Б синусовую тахикардию, отклонение электрической оси влево, левожелудочковые экстрасистолы В синусовую тахикардию, отклонение электрической оси вправо, отрицательные зубцы т в iii стандартном и v1-v3 отведениях Г отклонение электрической оси влево, низкий вольтаж зубца г в i и iii отведениях
	45	Для клеточной дегидратации наиболее характерно наличие

		А отеков Б мышечной гипотонии В жажды Г судорог
	46	При «белой» форме лихорадки у ребенка наблюдают А брадипноэ Б цианоз губ В жажду Г гиперемию щек
	47	Подтверждение диагноза контактного аллергического дерматита проводят с помощью _____ с аллергеном А внутрикожной пробы Б аппликационной пробы В кожной скарификационной пробы Г прик-теста
	48	Развитие плеврита в первые 2-3 дня от начала заболевания характерно для _____ пневмонии А микоплазменной Б пневмоцистной В стафилококковой Г пневмококковой
	49	Кровохарканье при туберкулезе свидетельствует о А нарушении целостности плевры Б диссеминации процесса В затихании процесса Г распаде легочной ткани
	50	При обструктивном бронхите у детей выявляется _____ одышка А смешанная Б рестриктивная В инспираторная Г экспираторная
	51	Макроглотсия наблюдается при А отите Б пневмонии В гайморите Г микседеме
	52	О функциональном происхождении систолического шума у ребенка 6 лет свидетельствует А усиление в вертикальном положении Б нарастание интенсивности после нагрузки В непродолжительный характер Г проведение на сосуды шеи

	53	Выраженная фибриногенемия наблюдается при А цистите Б гломерулонефрите нефротической формы В мочекаменной болезни Г наследственном нефрите
	54	Данные о функциональном состоянии каждой почки в отдельности у детей могут быть получены при А радиоизотопной ренографии Б обзорной урографии В ультразвуковом исследовании мочевой системы Г исследовании клиренса эндогенного креатинина
	55	К характерным особенностям онтогенеза ребенка в возрасте двух месяцев жизни относят умение А сосать пальцы руки и ноги Б лежа на животе, опираться на кисти рук В удерживать голову при вертикализации Г поворачиваться с живота на спину
	56	Дефицит массы тела при постнатальной гипотрофии II степени составляет (в процентах) А 20-30 Б 10-20 В 6-8 Г 30 и более
	57	Основным исследованием при подозрении на язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки является А исследование кала на скрытую кровь Б дуоденальное зондирование В копрограмма Г фиброэзофагогастродуоденоскопия
	58	Клиническая картина функциональной диспепсии у детей включает А ночное недержание мочи и энкопрез Б отсутствие признаков органического поражения желудка В болезненность и тугоподвижность мелких суставов Г субфебрилитет неясного генеза
	59	Клонико-тонические судороги у новорожденных детей сопровождаются А повышением внутричерепного давления Б повышением артериального давления В увеличением потребности мозга в кислороде Г резким увеличением метаболизма глюкозы
	60	Запах мочи при дыхании от пациента в заторможенном состоянии свидетельствует о наличии у него комы А первичной церебральной Б токсической В печеночной

	Г	почечной
61	А Б В Г	Симптом эксикоза при острых кишечных инфекциях характеризуется изменением времени капиллярной реперфузии уплотнением каловых масс повышением диуреза повышением влажности кожи
62	А Б В Г	Рентгенологическое контрастное исследование почек и мочевых путей называют томографией ирригоскопией хромоцистоскопией экскреторной урографией
64	А Б В Г	К ранним признакам острой почечной недостаточности относят билирубинемия повышение мочевины в крови увеличение плотности мочи полиурию
65	А Б В Г	У девочки 12 лет с бронхильной астмой, эозинофилией до 25%, лихорадкой, миалгиями и арталгиями, ливедо, подкожными узелками вероятен диагноз болезни Шенлейн-Геноха ювенильный дерматомиозит ювенильный идиопатический артрит синдром Черджа-Стросса
66	А Б В Г	К инвазивной диагностике бактерии <i>H. pylori</i> относится гистологический метод уреазный дыхательный тест определение антител в сыворотке крови определение антигена <i>H. pylori</i> в кале
67	А Б В Г	Для гипертиреоза характерно нарушение ритма в виде аритмии тахикардии экстрасистолии брадикардии
68	А Б В Г	Ведущим клиническим синдромом РС-инфекции является геморрагический катаральный интоксикационный бронхообструктивный
69	А	Значительное увеличение размеров черепа при нормальных размерах других частей тела называется макроцефалией

		Б брахицефалией В микроцефалией Г долихоцефалией
	70	Средняя частота сердечных сокращений в покое за 1 минуту у доношенного новорожденного составляет А 160 Б 100 В 80 Г 140
	71	Ребенок в 1 год 6 месяцев может выполнять А кувырок вперед Б перешагивание через препятствия В бег по дороге, имеющей угол наклона Г самостоятельное приседание и вставание
	72	Боль в грудной клетке при крупозной пневмонии обусловлена А вовлечением в воспалительный процесс бронхиального дерева Б деструкцией легочной ткани В нарушением микроциркуляции Г вовлечением плевры в воспалительный процесс
	73	Легкая смещаемость внутренних органов у детей раннего возраста объясняется слабостью А опорной жировой ткани Б связочного аппарата В мышечных структур Г основных костных структур
	74	Темпы прироста окружности головы у недоношенного ребенка в первые 6 месяцев жизни составляют ____ см в месяц А 2,0-3,0 Б 3,0-4,0 В 1,0-1,5 Г 0,5-1,0
	75	Разница в артериальном давлении более 10 мм рт.ст. На плечевых артериях характерна для А коарктации аорты Б гранулёматоза вегенера В болезни такааясу Г болезни кавасаки
	76	Для больных гипотиреозом характерно наличие А артериальной гипертензии Б диареи В запора Г аритмии

	77	Ведущим симптомом заболевания является одышка при А инородном теле бронхов Б идиопатическом фиброзирующем альвеолите В ларинготрахеите Г простом остром бронхите
	78	Осиплость голоса возникает при А аденоидите Б трахеите В рините Г ларингите
	79	К характерным признакам геморрагического синдрома при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре относят _____ высыпаний А. Полихромность и несимметричность Б. Одномоментность и монохромность В. Монохромность и симметричность Г. Одномоментность и симметричность
	80	Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевоом осадке свидетельствует о А. Аномалии развития органов мочевой системы Б. Остром пиелонефрите В. Остром гломерулонефрите Г. Гемолитико-уремическом синдроме
ПК-2, ОПК-5	1.	При инфекционной диарее не рекомендуется применение А) смектита диоктаэдрического Б) лоперамида В) оральной регидратации Г) энтерола
	2.	Энтеросорбентом является А бифиформ Б смектит диоктаэдрический В гентамицин Г кипферон
	3.	Для лечения желудочковой тахикардии нельзя использовать А лидокаин Б дигоксин В амиодарон Г прокаинамид
	4.	Назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента приводит к ухудшению функции почек при А пиелонефрите Б гломерулонефрите

		В цистите Г двустороннем стенозе почечных артерий
	5.	Для гемодинамической коррекции вПС с единственным полноценным желудочком сердца показано выполнение операции А рашкинда Б росса В растелли Г фонтена
	6.	В лечении сердечной недостаточности новорожденных не используют А сердечные гликозиды Б β-адреномиметики В диуретики Г ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
	7.	Детям раннего возраста противопоказано назначение антибиотиков группы А цефалоспоринов Б пенициллинов В тетрациклинов Г карбопенемов
	8.	К антилейкотриеновым препаратам для лечения бронхиальной астмы относится А недокромил Б омализумаб В монтелукаст Г ипратропиум бромид
	9.	Глюкокортикостероидным средством для наружной терапии атопического дерматита является А натамицин Б диклофенак В рутозид Г метилпреднизолона ацепонат
	10.	Длительность антибактериальной терапии инвазивных острых кишечных инфекций у детей должна быть в пределах (в днях) А 8-9 Б 10-12 В 21-30 Г 5-7
	11.	Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иапф) при сердечной недостаточности используют А только у тяжелых больных Б у всех больных при отсутствии противопоказаний В только при систолической дисфункции Г только при отсутствии отеочного синдрома

	12.	Антибиотиками выбора при лечении нетяжелого пиелонефрита у детей являются А цефалоспорины Б карбапенемы В аминогликозиды Г фторхинолоны
	13.	Строгий постельный режим показан ребенку с пиелонефритом а первые 2-3 дня болезни Б в острый период заболевания В в период бактериурии Г до полного выздоровления
	14.	При лечении наследственного нефрита обосновано назначение А дезагрегантов Б плазмафереза В преднизолона Г цитостатических препаратов
	15.	Показанием для переливания крови новорожденному с гемолитической болезнью новорожденных является почасовой прирост билирубина на (в ммоль/л) А 8-12 Б 5-8 В 6-10 Г 7-12
	16.	Проводить коррекцию нарушений обмена кальция в организме позволяет применение витамина А В 6 Б Д В А Г В 2
	17.	Суточная доза флутиказона для базисной терапии у детей со среднетяжёлой бронхиальной астмой составляет (в мкг) А 100-200 Б 50-100 В 400-600 Г 200-400
	18.	Применение сосудорасширяющих препаратов при гипертермическом синдроме способствует А повышению кровоточивости периферических сосудов Б спазму центральных сосудов В усилению периферического кровотока и теплоотдаче Г повышению температуры тела вследствие децентрализации кровообращения
	19.	Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов конечностей является А максимальное сгибание конечностей

		Б максимальное разгибание конечностей В наложение кровоостанавливающего жгута Г пальцевое прижатие поврежденного сосуда
	20.	При целиакии необходимо исключить из рациона продукты из муки А рисовой Б кукурузной В пшеничной Г амарантовой
	21.	Тактика лечения лактазной недостаточности у ребенка, находящегося на грудном вскармливании, включает А исключение грудного молока с заменой на безлактозные смеси Б подбор дозы фермента лактазы В перевод на искусственное вскармливание адаптированными смесями Г назначение антибактериальной терапии
	22.	При внутрипеченочном холестазе противопоказано назначение А повидона Б фосфолипидов В витамина Е Г цефтриаксона
	23.	Тактика терапии у ребенка 8 лет после перенесенной острой кишечной инфекции с сохраняющимися жалобами на дискомфорт в животе после еды должна включать А нифуроксид Б диоктаэдрический смектит В фамотидин Г панкреатин
	24.	С целью уменьшения частоты приступов кашля применяется Г аминофиллин Б хлоропирамин В амброксол Г бутамират натрия
	25.	При лечении бактериальных гнойных менингитов назначают А нестероидные противовоспалительные средства Б антибиотикотерапию В витаминотерапию Г противовирусную терапию
	26.	Препаратом с холиолитическим действием, используемым в лечении желчекаменной болезни у детей, является А урсодезоксихолевая кислота Б омепразол В фосфоглив Г артишока листьев экстракт

	27.	При лечении целиакии из рациона исключают А салат, щавель, бобовые Б блюда из свинины и баранины В продукты из ржи, пшеницы, ячменя, овса Г продукты, содержащие коровье молоко
	28.	Для эрадикации <i>h.pylori</i> используют А омепразол+амоксикаллин+метронидазол+висмута трикалия дицитрат Б омепразол+сукральфат+метронидазол+висмута трикалия дицитрат В омепразол+амоксикаллин+спирамицин Г омепразол+амоксикаллин+метронидазол+спирамицин
	29.	Ребенку 4 месяцев с гастроинтестинальной формой аллергии на белки коровьего молока при искусственном вскармливании показана смесь А адаптированная молочная с пребиотиками Б на основе частичногидролизованного молочного белка В безлактозная адаптированная Г на основе высокогидролизованного молочного белка
	30.	Ребенку 3 месяцев с атопическим дерматитом и аллергией на белки коровьего молока, находящемся на грудном вскармливании, следует рекомендовать А смесь на основе частичногидролизованного молочного белка Б адаптированную молочную смесь с пребиотиками В грудное молоко и соблюдение мамой безмолочной диеты Г смесь на основе высокогидролизованного молочного белка
	31.	При остром обструктивном ларингите (крупе) у детей применяют А антигистаминные препараты Б антибиотики В глюкокортикостероиды Г ксантины
	32.	При проведении повторной дефибрилляции при шоковом ритме у ребёнка следует использовать энергию (в дж /кг) А 40 Б 20 В 10 Г 4
	33.	Для лечения обструктивного бронхита показано назначение А противокашлевых препаратов Б антибиотиков В бронхолитиков, кортикостероидов Г антигистаминных препаратов
	34.	Ребенку 10 месяцев с орви, у которого развился гипертермический синдром: температура тела – 39,5°С, одышка, тахикардия, бледность кожи, конечности цианотичные, холодные, не показаны

		А сосудорасширяющие препараты Б влажные обертывания В антипиретики Г антигистаминные препараты 1 поколения
	35	Ведущую роль в лечении функциональных запоров у детей раннего возраста выполняет А нормализация режима и диеты Б физиотерапия В фитотерапия Г. Лекарственная терапия
	36	Кратность введения антибиотиков у грудных детей должна быть реже из-за А нарушения кислотно-основного состояния Б длины и извитости мочеточников В низких показателей клубочковой фильтрации Г недостаточного развития коркового слоя
	37	Для лечения артериальной гипертензии у больных с бронхиальной астмой противопоказаны А антагонисты кальция Б диуретики В антагонисты рецепторов к ангиотензину ii Г неселективные β -адреноблокаторы
	38	Геморрагический цистит входит в число побочных эффектов при лечении А микофенолата мофетилом Б азатиоприном В циклофосфамидом Г циклоспорином
	39	Препаратом выбора для ингаляций при стенозе гортани i степени является А амброксол Б ипратропия бромид + фенотерол В сальбутамол Г будесонид
	40	Наиболее часто используемым стимулятором секреции является А кофеин Б вода В хлеб Г гистамин
	41	В терапии желчнокаменной болезни показано назначение А холекинетиков Б спазмолитиков В прокинетиков Г холеретиков

	42	Дествующим веществом препарата «дюфалак» является А целлюлоза Б лактулоза В сахароза Г глюкоза
	43	Применение ингаляционных глюкокортикостероидов при остром обструктивном ларингите (крупe) необходимо начинать не позднее ____ от момента установления диагноза А 24 часов Б 3 часов В 1 часа Г 30 минут
	44	Способностью стимулировать выработку сурфактанта обладает муколитик А амброксол Б ацетилцистеин В карбоцистеин Г гвайфенезин
	45	В качестве муколитической терапии при муковисцидозе применяют А щелочные ингаляции Б дорназу-альфа В бромгексин Г фитоингаляции
	46	Препаратом, который может увеличить количество оксалатов в моче, является А витамин b6 Б хлорохин В аскорбиновая кислота Г ацетилсалициловая кислота
	47	Для лечения артериальной гипертензии у больных с бронхиальной астмой противопоказаны А антагонисты рецепторов к ангиотензину ii Б диуретики В антагонисты кальция Г неселективные β-адреноблокаторы
	48	Эффективность антибактериальной терапии оценивается А в течение пяти суток от начала лечения Б в течение трех суток от начала лечения В в течение первых суток от начала лечения Г по окончании курса лечения
	49	Продолжительность антибиотикотерапии при остром пиелонефрите составляет не менее (в днях) А 14 Б 5

	В 10 Г 7
50	К показаниям для назначения кортикостероидов при пневмонии относят шок, а также А. Признаки деструкции легочной ткани и кашель Б. Высокую температуру и кишечные расстройства В. Высокую температуру и длительный непродуктивный кашель Г. Отек мозга и отек лёгкого
51	Суточная доза преднизолона при iii степени вирусного крупа составляет _____ мг/кг массы тела А. 8-10 Б. 1-2 В. 0,75 Г. 3-5
52	Наименьшим подавляющим действием на облигатную флору кишечника обладают А. Пенициллины Б. Макролиды В. Аминогликозиды Г. Цефалоспорины
53	Медикаментозное лечение при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (гэрб) не предусматривает назначение А. Прокинетиков Б. Антигистаминных препаратов В. Антисекреторных препаратов Г. Антацидных препаратов
54	Препаратом первой линии для лечения острого цистита у детей старше 5 лет является А. Фосфомицин Б. Амоксициллин + клавуланат В. Амикацин Г. Ампициллин
55	При обострении хронического пиелонефрита после курса антибиотикотерапии следует курс лечения А. Поливитаминами Б. Витаминами группы В. В мочегонными сборами Г. Уросептиками
56	К топическим ингибиторам кальциневрина, применяемым для лечения атопического дерматита, относится А. Мометазон Б. Декспантенол В. Флутиказон Г. Пимекролимус
57	Мембраностабилизирующим препаратом, который применяют в лечении атопического дерматита, является А. Кетотифен

		Б. Цетиризин В. Преднизолон Г. Мометазон
	58	Наиболее эффективным и безопасным препаратом для лечения лямблиоза у детей является А. Альбендазол Б. Мебендазол В. Нифуратель Г. Фуразолидон
	59	Бактерицидным действием против <i>helicobacter pylori</i> обладает А. Алгелдрат + магния гидроксид Б. Ребамипид В. Фамотидин Г. Висмута трикалия дицитрат
	60	Препаратом, который показан ребёнку с нефротическим синдромом в активной фазе, является А. Бенфотиамин Б. Индометацин В. Хлорохин Г. Преднизолон
ПК-4	1	После введения новорождённому ребёнку вакцины бцж в месте инъекции папула может появиться через (в месяцах) А 2-3 Б 1-1,5 Г 3-4 Г 2-2,5
	2	Интервал между первой и второй вакцинацией против вирусного гепатита b составляет (в днях) А 45 Б 30 В 80 Г 60
	3	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок детям не проводится обязательная вакцинация против А туберкулеза Б вируса папилломы человека В полиомиелита Г коклюша
	4	Для вакцинопрофилактики вирусного гепатита В применяют А синфлорикс Б приорикс В регевак

		Г пентаксим
5	Для пассивной иммунопрофилактики используют	А генноинженерные вакцины Б иммуноглобулины В живые вакцины Г анатоксины
6	Профилактические прививки детям с бронхиальной астмой проводят в период	А приступа Б подростковый В ремиссии Г обострения
7	Решающее значение для ликвидации полиомиелита имеет	А экстренная вакцинация непривитых Б очаговая дезинфекция В плановый охват прививками на 96 и более процентов Г наблюдение за контактными в очаге инфекции в течение трех недель
8	Для профилактики пищевой аллергии предпочтительны смеси	А на основе козьего молока Б адаптированные кисломолочные В на основе сои Г частичногидролизированные
9	Противопоказанием для проведения вакцинации является	А атопический дерматит, неполная ремиссия Б хроническое заболевание в стадии ремиссии В местная реакция на предыдущее введение вакцины – гиперемия 2 см Г лихорадка свыше 40°C в ответ на предыдущее введение вакцины
10	Вакцинации против клещевого энцефалита подлежат дети	А обратившиеся после присасывания клеща на всей территории России Б контактные по клещевому энцефалиту В выезжающие на территории, эндемичные по клещевому энцефалиту Г перенесшие заболевания центральной нервной системы
11	После проведения вакцинации БЦЖ или БЦЖ-М другие профилактические прививки могут быть проведены с интервалом не менее ____ после БЦЖ, БЦЖ-М	А 3 месяцев Б 2 недель В 1 месяца Г 2 месяцев
12	Оптимальный рацион здорового взрослого человека должен включать по калорийности ____ % белка	А 12-14

		Б 31 В 19 Г 5
13	Для вакцинопрофилактики вирусного гепатита А у детей применяется	А приорикс Б пентаксим В регевак Г аваксим
14	Согласно национальному календарю интервал между вакцинациями АКДС на первом году жизни составляет (в месяцах)	А 3,5 Б 1,5 В 3 Г 1
15	Контактных по кори разобщают с (в днях)	А 7 Б 9 В 17 Г 21
16	Противопоказанием к вакцинации БЦЖ, БЦЖ-м считают	А генерализованную инфекцию бцж, выявленную у других детей в семье Б потерю 8% от первоначальной массы тела В проявления полового криза новорожденного Г переносимость (масса тела при рождении более 4500 г)
17	Для профилактики рахита применяют	А общее ультрафиолетовое облучение (УФО) Б диадинамотерапию В электрофорез Г УВЧ-терапию
18	Правильное питание женщины в период беременности для оптимального программирования метаболизма ребёнка включает	А повышенное поступление белка Б повышенное количество насыщенных жиров В достаточное поступление омега-3 полиненасыщенных жирных кислот Г увеличенное потребление углеводов
19	Профилактические прививки детям с хроническими заболеваниями проводятся не ранее чем через ____ месяц/ев после обострения	А 6 Б 3

		В 1 Г 2
20	За контактными по вирусному гепатиту а осуществляют медицинское наблюдение в течение	А 6 месяцев Б 2 месяцев В 35 дней Г 21 дня
21	Противопоказанием для введения вакцины против кори, краснухи, паротита является	А атопический дерматит в стадии неполной ремиссии Б аллергическая сыпь после употребления дрожжевого хлеба В тяжелая аллергическая реакция на аминогликозиды Г обострение атопического дерматита после употребления куриных яиц
22	Абсолютным противопоказанием со стороны ребенка к вскармливанию грудным молоком является	А галактоземия Б гемолитическая болезнь новорожденных В внутрижелудочковое кровоизлияние Г недоношенность
23	К пищевым веществам в рационе детей второго полугодия жизни, которые корректируют дефицит жиров, относят	А сахарный сироп Б подсолнечное масло В творог Г йогурт
24	Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания детей с 1 года до 3-лет составляет	А 1:1:4 Б 1:1:6 В 1:1:3 Г 1:1:5
25	При кишечной форме муковисцидоза жиры в пище	А увеличивают Б строго ограничивают В исключают полностью Г разрешают по физиологической потребности
26	Ребенку с паратрофией I степени в возрасте 9 месяцев в диете следует ограничить	А творог, мясные продукты Б объем употребляемых овощных пюре В углеводы за счет хлебобулочных изделий, соков, каши Г объем употребляемой пищи до 800 мл в сутки
27	Смеси на основе козьего молока используют для	А профилактики аллергии к белкам коровьего молока

		Б лечение детей с аллергией к белкам коровьего молока В для профилактики пищевой аллергии Г питания здоровых детей
	28	В комплекс профилактики возникновения атопического дерматита у детей входит/входят А длительные прогулки на свежем воздухе Б отказ от использования мыла, шампуня, крема с высокими значениями pH В ежедневные закаливающие процедуры Г лечение хронических очагов инфекции
	29	Вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита противопоказана лицам, у которых в анамнезе отмечается А аллергия к аминогликозидам или яичному белку Б осложнение на введение вакцины против гриппа В аллергия к дрожжам Г осложнение на введение АКДС-вакцины
	30	Вакцинация против гепатита в проводится трехкратно по стандартной схеме А 0-6-12 Б 0-1-2 В 0-1-6 Г 0-3-12
	31	Отличие вакцины БЦЖ от БЦЖ-М состоит в А наличии в составе консерванта – мертиолята Б количестве живых микробных тел в 1 мл В разных штаммах микобактерий Г наличии адьюванта – фосфата алюминия
	32	Если наставление к вакцине, привезённой из-за рубежа, отсутствует, ребёнка привить данной вакциной А можно, предварительно изучив характеристику вакцины по этикетке Б можно, если вакцина есть в перечне зарубежных вакцинных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации В можно, только после согласования с главным врачом поликлиники Г нельзя
	33	В рацион питания ребёнка для профилактики дефицита железа необходимо включать А мясо Б злаковые В творог Г цитрусовые
	34	Ревакцинации БЦЖ подлежат здоровые неинфицированные микобактерией туберкулеза дети в возрасте (в годах) А 13-14 Б 11-12 В 6-7

	Г	4-5
35	А Б В Г	Перед проведением вакцинации бцж врач должен побеседовать с родителями о/об согласии на проведение вакцинации обстоятельствах выписки новорожденного диспансеризации здоровых детей реакции на другие профилактические прививки
36	А Б В Г	Наиболее важным методом диагностики туберкулеза у подростков является туберкулинодиагностика общий анализ крови и мочи флюорография исследование мокроты на микобактерии туберкулеза
37	А Б В Г	Проведение профилактических прививок ребёнку, перенёсшему инфекционный гепатит, возможно через _____ месяц/месяца после выздоровления 3 1 4 2
38	А Б В Г	Для вакцинопрофилактики вирусного гепатита применяют убитую вакцину рекомбинантную вакцину живую вакцину противовирусный иммуноглобулин
39	А Б В Г	Причиной возникновения алиментарно-конституционального ожирения является гиперкортицизм гипотиреоз гиподинамия гипогонадизм
40	А Б В Г	Вакцинацию против гемофильной инфекции детям старше 1 года проводят трехкратно с интервалом в 45 дней двукратно с интервалом в 6 месяцев однократно двукратно с интервалом в 2 месяца
41	А Б В Г	Ребёнку и его семье при диагностировании у него бронхиальной астмы врач должен рекомендовать обучение на дому смену места жительства исключение всех физических нагрузок посещение астма-школы
42	А	Вакцинация против гемофильной инфекции рекомендована детям с анемией

		Б с гемолитической болезнью новорожденных В с онкогематологическими заболеваниями Г рожденным от матерей с нарушениями свертывания крови
	43	В российской федерации неонатальный скрининг позволяет выявлять врожденный А гипогонадизм Б гипотиреоз В гипопитуитаризм Г сахарный диабет
	44	Ребенку с гипотрофией I степени в периоде реконвалесценции профилактические прививки А. Проводятся по щадящей методике Б. Проводятся через 2 недели после окончания лечения В. Не проводятся Г. Проводятся по календарю
	45	Мероприятием первичной профилактики развития атопического дерматита является А. Соблюдение гипоаллергенного режима Б. Правильное питание беременной В. Сохранение грудного вскармливания Г. Отказ от профилактических прививок
	46	Ранним называют прикладывание ребенка к груди матери А. В первые 30 минут после рождения Б. В первые 3 часа после рождения В. В первые сутки после рождения Г. До перевязывания пуповины
	47	В комплекс профилактики возникновения атопического дерматита у детей входит/входят А. Отказ от использования мыла, шампуня, крема с высокими значениями pH Б. Ежедневные закаливающие процедуры В. Лечение хронических очагов инфекции Г. Длительные прогулки на свежем воздухе
	48	Абсолютным противопоказанием для вакцинации бцж, бцж-м является А. Гемолитическая болезнь новорожденных в анамнезе Б. Внутриутробная инфекция в анамнезе В. Гнойно-септическое заболевание в анамнезе Г. Вич-инфекция у ребенка
	49	Путешественникам, планирующим отдых в Индии, показана вакцинация против А. Клещевого энцефалита Б. Чумы В. Брюшного тифа Г. Туляремии
	50	Молозиво характеризуется

		А низкой энергетической ценностью Б низким содержанием гормонов и гормоноподобных веществ В высоким содержанием факторов иммунной защиты Г большим содержанием воды
	51	Калорийность грудного молока в процессе становления лактации А возрастает Б волнообразно изменяется В уменьшается Г не меняется
	52	Для профилактики рахита используют _____ раствор витамина ____ по _____ ежедневно А. Водный; d3; 2000-3000 me Б. Водный; d3; 500-1000 me В. Масляный; d; 1 капле Г. Водный; d3; 250 me
	53	Постнатальную профилактику железодефицитной анемии проводят детям А. Перенесшим пневмонию Б. С патологией центральной нервной системы В. Родившимся недоношенными Г. Страдающим гнойничковыми заболеваниями кожи
	54	Профилактическая доза витамина д для доношенных детей первого года жизни составляет (в ме) А. 1000 Б. 100 В. 5000 Г. 200
	55	Первичную вакцинацию от менингококковой инфекции в возрасте от 2 до 55 лет проводят А. Однократно Б. Трехкратно с интервалом не менее 1 месяца В. Двукратно с интервалом 3 месяца Г. Двукратно с интервалом 1,5 месяца
	56	Для иммунизации детей до года против полиомиелита согласно национальному календарю профилактических прививок применяется схема А. Ипв-ипв-опв Б. Ипв-ипв-ипв В. Ипв-опв-опв Г. Опв-опв-опв
	57	Если после нападения животного у ребенка нет повреждения и ослонения кожных покровов, то лечебно-профилактическая иммунизация против бешенства А. Проводится по схеме 0-3-7-14 Б. Проводится по короткой схеме 0-3-7

		В. Проводится по полной схеме 0-3-7-14-30-90 Г. Не проводится
58		Из применяемых коклюшных вакцин менее реактогенной считают _____ вакцину А. Бесклеточную Б. Химическую В. Цельноклеточную Г. Субъединичную
59		Наибольшая концентрация пыльцы лебеды в средней полосе России наблюдается в А. Июне Б. Августе В. Мае Г. Октябре
60		Мерой профилактики отставания в нервно-психическом развитии ребенка с фенилкетонурией является назначение А. Лечебных смесей Б. Безлактозных смесей В. Аглиадиновой диеты Г. Заместительной энзимотерапии
61		Вакциной против дифтерии, столбняка, коклюша, которая разрешена к применению с 4 до 64 лет, является А. Адасель Б. АКДС В. Инфанрикс Г. АДС-М
62		Естественный пассивный иммунный ответ возникает в результате А. передачи защитных факторов от матери плоду Б. контакта с возбудителем В. введения в организм готовых антител Г. введения в организм вакцины
63		Формирование противотуберкулезного иммунитета после вакцинации бцж происходит А. 6 месяцев Б. 6-8 недель В. 1 год Г. 2-3 недели
64		Непременным условием успешного выхаживания недоношенных новорожденных является ____ рождения А. введение растворов в вену пуповины сразу после Б. дополнительный обогрев с момента В. дополнительное охлаждение с момента Г. искусственная вентиляция легких сразу после

